



Motif de continuation du carbapénème après 72 heures

Motif de continuation du carbapénème	Code
Recommandation locale pour ce type de malade	1
Sepsis sévère	3
Choc septique	4
≥ 2 sites d'infections	5
Infection polymicrobienne documentée	6
Infection documentée à germe sensible uniquement à ce carbapénème	8
Infection documentée à BGN hyperproducteur de céphalosporinase (AmpC) chromosomique ou producteur de céphalosporinase plasmidique (et non producteur de BLSE)	9
Infection documentée à BGN producteur de BLSE sensible aux carbapénèmes et à d'autres antibiotiques (aminosides / fluoroquinolones / cotrimoxazole) (y compris les BGN BLSE producteurs aussi de céphalosporinase)	10
Infection documentée à BGN producteur de BLSE sans aucune autre possibilité thérapeutique (y compris les BGN BLSE producteurs aussi de céphalosporinase)	11
Allergie à d'autres antibiotiques	12
Toxicité due à d'autres antibiotiques	13
Autre raison non citée ci-dessus	98
Pas de raison exprimée	99

(pas de code 2 ni de code 7)

Si plusieurs réponses possibles, suivre l'ordre hiérarchique inverse des codes (excepté 99) :

12 > 11 > 10 > 9 > 8 etc